

	NAVODILO	Oznaka: Stran: Velja od: Izdaja:	NA OP PED 5 1/2 11.6.2013 1
	PEDIATRIČNI ODDELEK KLINIČNA POT: ABDOMINALNE KOLIKE		

Abdominalne kolike

Ponavadi so neznanega vzroka, pojavijo se iznenada. Spremlja jih jok otroka v trajanju več kot 3 ure na dan. Obdobje pojavljanja je med 3 tedni in 3 meseci, najbolj pogoste so pri 6 tednih. Prisotne so pri 15% zdravih otrok, ne glede na to ali so naravno ali umetno hranjeni. Potrebna je natančna anamneza in fizikalni pregled, da bi se izključila organska etiologija. Ob tem je treba izključiti: intususcepcijo, inkarcerirano kilo, frakturo, zanemarjenje otroka, intoleranco na laktozo, preobčutljivost na proteine kravjega mleka, gastroezofagealni refluks. Ponavadi izginejo po tretjem mesecu starosti

Pripis: na strani dve so podpisi in jih prejme skrbnik sistema za kakovost.

	NAVODILO	Oznaka: Stran: Velja od: Izdaja:	NA OP PED 5 2/2 11.6.2013 1
	PEDIATRIČNI ODDELEK KLINIČNA POT: ABDOMINALNE KOLIKE		

	Ime in priimek:	Datum:	Podpis:
Avtor :	V UPORABI ŽE PRED SISTEMOM KAKOVOSTI		
Skrbnik:	MARJETA TOMŠIČ-MATIČ		
Pregledal:	ANA GRACNER		
Odobril:	Odbor za kakovost		
Skrbnik sistema za kakovost:	DAVID SLAPŠAK		

SEZNAM OSEB, KI ZAGOTOVIJO, DA SO Z NAVODILI SEZNANJENI

Zap.št.	Ime in priimek:	Datum:	Podpis:
1.	MARJETA TOMŠIČ-MATIČ		
2.	KATJA MACERL		