

	NAVODILO	Oznaka: Stran: Velja od: Izdaja:	NA OP PED 5 1/2 11.6.2013 1
	PEDIATRIČNI ODDELEK KLINIČNA POT: ZDRAVLJENJE AKUTNE OKUŽBE SEČIL		

Zdravljenje akutne okužbe sečil

Osnove:

Poznamo infekcije sečil zgornjega trakta, ki zajemajo ledvični parenhim. Večino teh obolenj spremlja visoka vročina in pozitivna urinokultura. Med infekcije spodnjega trakta uvrščamo infekcije mehurja, ki so najbolj pogoste pri starejših otrocih in adolescentih. Ponavadi potekajo brez vročine.

Splošni ukrepi:

Infekcije zgornjega trakta: i. v. terapija z ampicilinom in gentamicinom ali s tretjo generacijo cefalosporinov, kot na primer ceftriakson i. v. do kliničnega izboljšanja. Ta način zdravljenja je primeren za novorojenčke in za otroke s prirojenimi napakami v urinarnem traktu. Trajanje terapije je 10 do 14 dni.

Infekcije spodnjega trakta: oralno zdravljenje z amoksicilinom, trimetoprinom pri otrocih starejših od dveh mesecev. Trajanje terapije je 5 do 7 dni.

Pravočasno zdravljenje vročinskih urinarnih infekcij zmanjšuje riziko nastajanja ožiljkov in posledic le teh.

Pripis: na strani dve so podpisi in jih prejme skrbnik sistema za kakovost.

Dokumenti se računalniško vodijo. Natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. Originalni dokumenti so shranjeni pri skrbniku sistema za kakovost.

	NAVODILO	Oznaka: Stran: Velja od: Izdaja:	NA OP PED 5 2/2 11.6.2013 1
	PEDIATRIČNI ODDELEK KLINIČNA POT: ZDRAVLJENJE AKUTNE OKUŽBE SEČIL		

	Ime in priimek:	Datum:	Podpis:
Avtor :	V UPORABI ŽE PRED SISTEMOM KAKOVOSTI		
Skrbnik:	MARJETA TOMŠIČ-MATIČ		
Pregledal:	ANA GRACNER		
Odobril:	Odbor za kakovost		
Skrbnik sistema za kakovost:	DAVID SLAPŠAK		

SEZNAM OSEB, KI ZAGOTOVIJO, DA SO Z NAVODILI SEZNANJENI

Zap.št.	Ime in priimek:	Datum:	Podpis:
1.	MARJETA TOMŠIČ-MATIČ		
2.	KATJA MACERL		