

	OBRAZEC	Oznaka: Stran: Velja od: Izdaja:	SOP AR 13 OBR 1 1/2 4.4.2021 1
	LAJŠANJE PORODNE BOLEČINE Z REMIFENTANILOM – INFORMACIJE IN PRIVOLITEV PORODNICE		 AR20001301-0201

_____ Ime in priimek pacientke
_____ Datum rojstva
Prostor za nalepko

KAJ JE REMIFENTANIL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Remifentanil sodi v skupino zdravil imenovanih Opioidi. Ta zdravila se običajno uporabljajo za uvedbo v anestezijo in/ali lajšanje bolečine med operacijo in po operaciji že več kot 50 let.

Remifentanil se skupaj z drugimi zdravili uporablja za uvedbo in/ali vzdrževanje anestezije in blažitev bolečine takoj po operaciji pri bolnikih vseh starosti. V zadnjih letih pa se je uveljavil tudi kot sredstvo za lajšanje bolečine v enotah za intenzivno terapijo.

V svetu se že skoraj desetletje uporablja tudi v porodniški anesteziji in pri lajšanju bolečine ob porodu.

Remifentanil je selektivni μ -opiatni agonist s hitrim pričetkom delovanja in kratkotrajnim učinkom. Koncentracije Remifentanila v krvi so sorazmerne z danim odmerkom. Po aplikaciji priporočenih odmerkov Remifentanila pade njegova učinkovitost na polovico v 3 do 10 minutah.

Presnavljajo ga encimi – nespecifične esteraze v krvi in tkivih. Rezultat presnove je nastanek metabolita, ki je pri živalih 4600-krat manj učinkovit od Remifentanila. Študije na ljudeh kažejo, da so vsi farmakološki učinki povezani z matično spojino (Remifentanilom). Učinkovitost metabolita pri ljudeh torej ni klinično pomembna. Razpolovna doba tega metabolita pri zdravi odrasli osebi je 2 uri.

Pri bolnikih z normalnim delovanjem ledvic se preko ledvic izloči 95 % primarnega metabolita Remifentanila v približno 7 do 10 urah.

KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI REMIFENTANIL

Če boste na katerokoli izmed naslednjih vprašanj odgovorili z "da", morate s tem seznaniti anesteziologa, preden prejmete Remifentanil:

- ☐ Ste kdaj med operacijo že občutili kakršnekoli neželene učinke?
- ☐ So vam povedali, da ste alergični na katerokoli zdravilo, uporabljeno med operacijo?
- ☐ Ste kadarkoli imeli težave z dihanjem?
- ☐ Imate počasen ali neenakomeren srčni utrip?
- ☐ So vam kdaj povedali, da imate nizek krvni tlak?
- ☐ Ste pred kratkim jemali druga zdravila, poznana kot beta blokatorji ali blokatorji kalcijevih kanalčkov?

Če jemljete še kakšna druga zdravila, vključno s tistimi, ki ste jih kupili sami, seznanite z njimi vašega anesteziologa.

MOŽNI NEŽELJENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Remifentanil neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Večina bolnikov, ki uporablja to zdravilo, nima z njim nikakršnih težav.

	OBRAZEC	Oznaka:	SOP AR 13 OBR 1
	LAJŠANJE PORODNE BOLEČINE Z REMIFENTANILOM – INFORMACIJE IN PRIVOLITEV PORODNICE	Stran:	2/2
Velja od:		4.4.2021	
	Izdaja:	1	 AR20001301-0201

Najpogostejši neželeni učinki Remifentanila, ki se pojavijo, so v direktni povezavi s farmakologijo μ -opiatnih agonistov. Neželeni pojavi običajno izzvenijo v nekaj minutah po zmanjšani hitrosti dajanja ali prenehanju dajanja Remifentanila, kar je tudi njegova glavna prednost.

Glede na pogostost pojavljanja neželenih učinkov so:

- zelo pogosti ($> 1/10$): slabost, bruhanje, otrplost skeletnih mišic, padec krvnega tlaka, padec saturacije
- pogosti ($> 1/100$, $< 1/10$): bradikardija, pooperativna hipertenzija, akutna depresija dihanja, apnoa, pruritus, pooperativno drhtenje
- občasni ($> 1/1.000$, $< 1/100$): hipoksija, zaprtost, pooperativne bolečine
- redki ($> 1/10.000$, $< 1/1.000$): prekomerna zaspanost, alergijska reakcija, asistolija / zastoj srca.

Nekateri ljudje so na zdravila alergični. Če kmalu po pričetku dajanja zdravila opazite katerega izmed naslednjih simptomov, takoj obvestite svojega zdravnika:

- nenadno sopenje, bolečine ali zatezanje v prsih,
- zatekanje vek, obraza, ustnic, jezika ali vratu,
- grudičast kožni izpuščaj (osip) kjerkoli po telesu.

KAKO UPORABLJAMO REMIFENTANIL

Remifentanil dovajamo s pomočjo posebne črpalke neposredno v žilo. Del zdravila dovajamo v obliki trajne infuzije, del pa v obliki majhnih odmerkov, ki jih črpalka vbrizga na zahtevo porodnice (s pritiskom na poseben gumb).

Podpisana _____, rojena _____, potrjujem, da sem seznanjena s tehniko ter možnimi stranskimi učinki in zapleti, da sem na dodatna vprašanja dobila zadovoljive odgovore in da svobodno soglašam s porodno analgezijo z Remifentanilom, opisano na tem obrazcu. Razlago, ki sem jo prejela, povsem razumem in nimam nobenih dodatnih vprašanj.

Podpis pacientke:

Datum in ura podpisa: _____

Podpis DMS – babice oz. DMS GIN - POR
oddelka, ki bo izvajala porodno analgezijo z
Remifentanilom:

Datum in ura podpisa: _____

Podpis anesteziologa:

Datum in ura podpisa: _____