

	OBRAZEC	Oznaka:	OBR OP KRG 2
	NAVODILO OB SPREJEMU NA PREDVIDEN KIRURŠKI POSEG	Stran:	1/3
		Velja od:	30.5.2013
		Izdaja:	1

Zaradi predvidenega operativnega posega vas v ponedeljek _____ ob _____ uri vljudno vabimo na pregled v anesteziološko in kirurško ambulantno SB Trbovlje, ki se nahaja v pritličju bolnišnice in vas prosimo, da s seboj prinesete:

1. Kartico zdravstvenega zavarovanja.
2. Napotnico za anesteziološki pregled pred sprejemom na operacijo.
3. Napotnico za sprejem na kirurški oddelek.
4. Vsa zdravila, ki jih redno prejemate doma.
5. Izkaznico o vodenju sladkorne bolezni in vsa zdravila za urejevanje krvnega sladkorja, če ste sladkorni bolnik.
6. Izkaznico o antikoagulantnem zdravljenju, če se zdravite z zdravili proti strjevanju krvi zaradi kakršnegakoli vzroka.
7. Vso dosedanje razpoložljivo medicinsko dokumentacijo (specialistično dokumentacijo).
8. Pribor za osebno nego, copate, jutranjo haljo, po želji spalno srajco ali pižamo.

Operativni poseg je predviden v tistem tednu, kot boste pregledani. Po pregledu boste tako odšli domov in prišli k nam na dan posega. Če boste operirani v **ponedeljek**, vas bomo poklicali konec tedna pred operacijo na sporočen telefon. V kolikor ste predvideni za poseg v **dnevni bolnišnici**, boste odšli domov isti dan popoldan. Prosimo vas, da si v tem primeru organizirate prevoz domov s spremljevalcem.

Seznam preiskav, ki naj jih opravi vaš osebni zdravnik ali pediater vašega otroka, za poseg v splošni anesteziji.

Če so izvidi normalni in osnovna bolezen stabilna, so lahko Rtg slike pljuč in srca stare do 6 mesecev, EKG do 3 mesece in laboratorijski izvidi do 4 tedne.

Predoperacijsko stanje	Hemogram	Krvni sladkor	Kreatinin	Kalij	ALT, AST, Alk.fosf., INR	Urin	EKG	RTG PC
STAROST								
Otroci od 6 mesecev dalje	+							
Odrasli pod 40 let	+							
Odrasli od 40 do 60 let	+	+	+				+	
Odrasli nad 60 let	+	+	+	+			+	+
SPREMLJAJOČE BOLEZNI								
Srčno žilna bolezen, AH*	+		+	+			+	+
Pljučna bolezen	+						+	+
Urejena sladkorna bolezen	+	+	+	+			+	
Jetrna bolezen	+				+			
Ledvična bolezen	+		+	+		+		
Rakava bolezen**	+	+	+	+	+	+	+	+
ZDRAVILA								
Diuretiki, digoksin			+	+			+	
Steroidi		+		+				
Statini					+			

* Arterijska hipertenzija

** Rakava bolezen – vključeno tudi obsevanje ali kemoterapija

Bolniki (odrasli ali otroci), ki bodo na dan sprejema tudi operirani, lahko do 2 uri pred posegom **pijejo** bistro tekočino (tekočina brez delcev ali maščob), čvrsto hrano pa lahko **jedo** do 6 ur pred posegom (to velja tudi za kravje mleko in mleko v prahu). Otroci lahko popijejo do 75 ml vode z zdravili do 1 uro pred uvodom v anestezijo. Dojenje je treba prenehati 4 ure pred uvodom v anestezijo; isto velja za mlečne pripravke za novorojenčke. Odrasli lahko popijejo do 150 ml vode z zdravili, ki jih sicer redno jemljejo do 1 uro pred uvodom v anestezijo. Kajenje in žvečenje se morata prekiniti najkasneje 2 uri pred uvodom v anestezijo. **ZA BOLNIKE Z ZNANO ALI PRIČAKOVANO ZAKASNITVIJO V PRAZNJENJU ŽELODCA TE SMERNICE NE VELJAJO!**

Seznam preiskav je v skladu z navodili sprejetimi na sestanku anesteziologov in zdravnikov splošne/družinske medicine, dne 29.09.2008.

Dokumenti se računalniško vodijo. Natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. Originalni dokumenti so shranjeni pri skrbniku sistema za kakovost.

 Splošna bolnišnica Trbovlje	OBRAZEC	Oznaka: Stran: Velja od: Izdaja:	OBR OP KRG 2 2/3 30.5.2013 1
	NAVODILO OB SPREJEMU NA PREDVIDEN KIRURŠKI POSEG		

- Bolniki, ki prejema katerokoli antikoagulacijsko terapijo (nizkomolekularni heparin, marevan, sintrom, pradaxa) morajo najkasneje 5 dni pred predvidenim operativnim posegom obiskati ambulantno za antikoagulacijsko zdravljenje zaradi prilagoditve njihovega antikoagulacijskega zdravljenja pred predvidenim kirurškim posegom.
- Visoko ogroženi bolniki, ki se zdravijo zaradi srčno-žilne bolezni (koronarna, karotidna, periferna arterijska bolezen), nadaljujejo zdravljenje z **acetilsalicilno kislino (Aspirin, Cardiopirin, Assasantin, Andol)** razen, če je po mnenju internista tveganje za krvavitev večje od tveganja za nov akutni žilni dogodek. Če poleg acetilsalicilne kisline bolniki prejema tudi druga antiagregacijska zdravila (**Plavix, Effient**), če je le mogoče, programsko operacijo odložimo do ukinitve dvotirne antiagregacijske terapije.

V primeru kakršnekoli nejasnosti vas prosimo, da pokličete našega anesteziologa vsak ponedeljek med 8. in 10. uro na tel.št. 03 56 52 598!

IME IN PRIIMEK BOLNIKA

Datum rojstva

NAPOTNA DIAGNOZA

SPREMLJAJOČE BOLEZNI

ZDRAVILA

DIETE

ALERGIJE

RAZVADE

PREJŠNJI POSEGI V ANESTEZIJI IN MOREBITNI ZAPLETI

Datum in opis

KOMENTAR PRILOŽENIH IZVIDOV

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Kirurški oddelek SB Trbovlje

Pripis: na strani tri so podpisi in jih prejme skrbnik sistema za kakovost.

Seznam preiskav je v skladu z navodili sprejetimi na sestanku anesteziologov in zdravnikov splošne/družinske medicine, dne 29.09.2008.

Dokumenti se računalniško vodijo. Natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. Originalni dokumenti so shranjeni pri skrbniku sistema za kakovost.

 Splošna bolnišnica Trbovlje	OBRAZEC	Oznaka: Stran: Velja od: Izdaja:	OBR OP KRG 2 3/3 30.5.2013 1
	NAVODILO OB SPREJEMU NA PREDVIDEN KIRURŠKI POSEG		

	Ime in priimek:	Datum:	Podpis:
Avtor :	ANA GRACNER		
Skrbnik:	ANA GRACNER		
Pregledal:	MARINA BAROVIČ		
Odobril:	Odbor za kakovost		
Skrbnik sistema za kakovost:	DAVID SLAPŠAK		

SEZNAM OSEB, KI ZAGOTOVIJO, DA SO Z OBRAZCEM SEZNANJENI

Zap.št.	Ime in priimek:	Datum:	Podpis:
1.	MARKO RIFEL		
2.	OLGA DOBERŠEK		
3.	ANA LAVRAČ TRAMPUŠ		

Seznam preiskav je v skladu z navodili sprejetimi na sestanku anesteziologov in zdravnikov splošne/družinske medicine, dne 29.09.2008.

Dokumenti se računalniško vodijo. Natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. Originalni dokumenti so shranjeni pri skrbniku sistema za kakovost.